



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Problematična uporaba droga u

Hrvatskoj

PDU procjene

Martina Markelić, prof. soc.

TAIEX workshop on Epidemiology and Biostatistics
17. prosinac 2013, Zagreb, Hrvatska



Definicija PDU – intravensko uzimanje droge ili dugotrajno/redovito uzimanje opijata, kokaina i/ili amfetamina.

*** definicija uključuje i one ovisnike koji su na redovitoj ili dugotrajnoj supstitucijskoj terapiji**



Izvori podataka

- Registrar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga (HZJZ) → podatci o liječenju osoba zbog zlouporabe opijata, kokaina i/ili amfetamina
- Odjel za mortalitetnu statistiku → podatci o uzroku smrti



Mortalitetni množitelj (Mortality multiplier)

- Mortalitetni množitelj → višegodišnji prosjek broja umrlih osoba zbog predoziranja / osobe umrle zbog predoziranja, a prethodno liječene zbog ovisnosti o psihoaktivnim drogama

2006.	1.41	2010.	1.53
2007.	1.39	2011.	1.53
2008.	1.51	2012.	1.52
2009.	1.54		

Godina liječenja	Metoda	Populacija	Osnovna populacija (liječeni ovisnici)	Centralna procjena	Gornja granica procjene	Donja granica procjene	Mortalitetni množitelj
2006.	MM	IDU	2353	3318	4128	2768	1.41
2007.	MM	IDU	2480	3447	4000	3024	1.39
2008.	MM	IDU	2157	3257	4148	2696	1.51
2009.	MM	IDU	2042	3145	4167	2521	1.54
2010.	MM	PDU	6384	9768	13029	7882	1.53
2010.	CRM	POU	6147- z 253- p	1072 6	11853	9598	
2011.	MM	PDU	6402	9796	12553	8104	1.53
2011.	MM	IDU	935	1431	1833	1184	1.53
2012.	MM	PDU	6587	1001 2	13723	7842	1.52
2012.	MM	IDU	838	1274	1746	998	1.52

- Hrvatska izračunava PDU procjene od 2006. godine i dostavlja ih u EMCDDA putem ST7
- zbog “stare” definicije* iz 2004 . godine od 2006.-2009. godine izračun procjene IDU (procjena populacije intravenskih ovisnika)
*“ injektiranje ili dugotrajno/redovito uzimanje opijata , kokaina i /ili amfetamina” (nisu bili uključeni oni ovisnici koji su bili na supstitucijskoj terapiji – nismo ih smatrali “problematičnima”)
- od 2010. godine u potpunosti prihvaćena definicija PDU i izračunava se procjena PDU (uključeni i ovisnici koji su na supstitucijskoj terapiji)



Promjena PDU indikatora i nova definicija u pripremi ...

Visokorizična uporaba droga mjerena kao uporaba psihoaktivnih supstanci (isključuje alkohol, duhan i kofein) visokorizičnom učestalošću ili načinom uzimanja u zadnjih 12 mjeseci



Nove procjene

- usvajanje novih metoda izračuna
- dostupni izvori podataka omogućavaju izračun visokorizične uporabe opijata
- visokorizična uporaba kanabisa → izvor podataka bi trebalo biti istraživanje opće populacije o uporabi kanabisa



Hvala na pažnji